

CANIKUR® PRO

**Diät-Ergänzungsfuttermittel
für Hunde und Katzen**



Bezeichnung des Tierarzneimittels

Canikur® Pro Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Unterstützung der natürlichen Darmflora bei Hunden und Katzen

Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile

Sojaöl, inaktivierte Hefe, Lupinenproteinmehl, Glukose, Natriumchlorid, Dinatriumhydrogenphosphat, Sonnenblumenöl

Inhaltsstoffe

Rohöle und -fette	43,6 %
Rohasche	21,1 %
Gehalt an salzsäureunlöslicher Asche	13,0 %
Rohprotein	6,0 %
Rohfaser	1,5 %

Zusatzstoffe

Enterococcus faecium (DSM 10663 / NCIMB 10415) (Darmflora-Stabilisator): 2×10^{12} KBE / kg, Bentonit 1m5581i (Montmorillonit, Adsorptionsmittel): 17% Canikur® Pro enthält Probiotika (*E. faecium*), die natürlich in einer gesunden Darmflora vorkommen, sowie Präbiotika (Bio-Mos®-C), die das Wachstum gesundheitsförderlicher Bakterien im Darm unterstützen, und Montmorillonit, ein natürliches Adsorptionsmittel, das Toxine und Viren bindet und aus dem Organismus entfernt.

Anwendungsgebiete

XXX

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Die Paste soll 2x täglich entsprechend der nachfolgenden Tabelle oral verabreicht werden:

Gewicht (kg)	Dosis (ml)	
	Hund	Katze
≤10	2	
11-25	4	
26-40	6	
>40	8	
		1-2

Drehen Sie den Ring an der Spritze bis zur gewünschten Dosierung und drücken Sie die Canikur® Pro Paste in den Futternapf oder direkt in das Maul des Hundes bzw. der Katze.

Verwenden Sie Canikur® Pro so lange, wie es als notwendig erachtet wird oder vom Tierarzt empfohlen wurde, aber nicht länger als 4 Wochen. Während einer Antibiotika-Behandlung verwenden Sie Canikur® Pro begleitend bis sieben Tage nach Beendigung der Antibiotika-Therapie.

Hinweise zur sachgerechten Anwendung

Zur Unterstützung und Erhaltung einer gesunden Darmflora bei einem erhöhten Risiko für, während oder zur Regeneration von Verdauungsstörungen (Durchfall). Canikur® Pro kann bei Störungen der Darmflora (z. B. bei akuten Durchfällen) allein oder in Kombination mit zusätzlich durch den Tierarzt verordneten Medikamenten eingesetzt werden. Zudem kann Canikur® Pro bei zu erwartenden negativen Einflüssen auf die Darmflora gegeben werden (z. B. in Stressphasen, bei Futterumstellung, während und nach Antibiotikagabe).

Gegenanzeigen

XXX

Nebenwirkungen

XXX

Wechselwirkungen

XXX

Warnhinweise

XXX

Lagerungshinweise

Lagerung an einem trockenen Platz, vor Sonnenlicht und hohen Temperaturen geschützt.

Datum der Information

Juli 2017

Packungsgrößen

Spritze mit 15 ml
Spritze mit 30 ml
Display mit jeweils 12 Spritzen

Spritze mit 60 ml
Verpackungskarton mit jeweils 6 Spritzen

