



Gebrauchsinformation: Information für Anwender

## Lymphdiaral®

### Halstabletten

**Wirkstoffe:**

**Scrophularia nodosa Ø, Echinacea D3, Hydrargyrum biiodatum (Mercurius bijodatus) D12**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was sind Lymphdiaral® Halstabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Lymphdiaral® Halstabletten beachten?
3. Wie sind Lymphdiaral® Halstabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Lymphdiaral® Halstabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was sind Lymphdiaral® Halstabletten und wofür werden sie angewendet?**

Lymphdiaral® Halstabletten sind eine homöopathische Arzneispezialität.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Erkrankungen.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

- Neigung zu Infekten im Hals-Nasen-Rachenraum mit Schwellung der Lymphknoten.

Lymphdiaral® Halstabletten sind ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel, das sich aus verschiedenen homöopathischen Einzelmitteln zusammensetzt, deren Arzneimittelbilder einander ergänzen.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 1 Jahr.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt

#### **2. Was sollten sie vor der Einnahme von Lymphdiaral® Halstabletten beachten?**

**Lymphdiaral® Halstabletten dürfen nicht eingenommen werden,**

wenn Sie allergisch gegen Scrophularia nodosa, Echinacea, Hydrargyrum biiodatum, insbesondere gegen Pflanzen aus der Familie der Korbblütler (z.B. Sonnenhut) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Aus grundsätzlichen Überlegungen dürfen Lymphdiaral® Halstabletten nicht eingenommen werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen, entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), Autoimmunerkrankungen, multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder anderen chronischen Viruskrankungen.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Lymphdiaral® Halstabletten einnehmen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine länger dauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

**Kinder**

Die Anwendung von Lymphdiaral® Halstabletten bei Kindern unter einem Jahr wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

**Einnahme von Lymphdiaral® Halstabletten zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

**Einnahme von Lymphdiaral® Halstabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme / Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor.

Die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

**Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Das Arzneimittel hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

**Lymphdiaral® Halstabletten enthalten Lactose-Monohydrat**

Dieses Arzneimittel enthält pro Tablette 249 mg Lactose (Milchzucker). Bitte nehmen Sie Lymphdiaral® Halstabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

#### **3. Wie sind Lymphdiaral® Halstabletten einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

**Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren**

Zu Behandlungsbeginn und bei akuten Beschwerden:

halbstündlich bis stündlich 1 Tablette (maximal 12-mal täglich)

Bei beginnender Besserung und bei chronischen Beschwerden: 1 bis 3-mal täglich 1 Tablette.

**Anwendung bei Kindern**

**Kinder (7 – 12 Jahre)**

Zu Behandlungsbeginn und bei akuten Beschwerden:

halbstündlich bis stündlich 1 Tablette (maximal 8 Tabletten täglich).

Bei beginnender Besserung und bei chronischen Beschwerden: 1 bis 3-mal täglich 1 Tablette.

**Kinder (1 – 6 Jahre)**

Zu Behandlungsbeginn und bei akuten Beschwerden:

halbstündlich bis stündlich 1 Tablette (maximal 6 Tabletten täglich).

Bei beginnender Besserung und bei chronischen Beschwerden: 1-mal täglich 1 Tablette.

Die Anwendung von Lymphdiaral® Halstabletten bei Kindern unter 1 Jahr wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

**Art der Anwendung**

Zum Einnehmen. Tabletten im Munde zergehen lassen.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Wenn Sie eine größere Menge von Lymphdiaral® Halstabletten eingenommen haben als Sie sollten**

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

**Wenn Sie die Einnahme von Lymphdiaral® Halstabletten vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es können bei Arzneimitteln wie Lymphdiaral® Halstabletten, die Zubereitungen von Sonnenhut enthalten, Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Es wurden Hautausschlag, Juckreiz, Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet, das Mittel ist dann abzusetzen. Angaben zur Häufigkeit des Auftretens von Nebenwirkungen können nicht gemacht werden.

Nach Anwendung von Hydrargyrum biiodatum kann vermehrt Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.

**Meldung von Nebenwirkungen** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Trasengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.bagv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie sind Lymphdiaral® Halstabletten aufzubewahren?**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und auf dem Blister nach „Verw. bis“ bzw. „verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Lymphdiaral® Halstabletten enthalten**

1 Tablette enthält:

Die Wirkstoffe sind:

Scrophularia nodosa Ø 100 mg,

Echinacea D3 100 mg,

Hydrargyrum biiodatum (Mercurius bijodatus) D12 100 mg.

Die sonstigen Bestandteile sind: Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Calciumbehenat.

### **Wie Lymphdiaral® Halstabletten aussehen und Inhalt der Packung**

Bikonvexe, hell-beige Tabletten, die in Blisterpackungen aus Polypropylen in einer Faltschachtel enthalten sind.

Packungsgrößen: 40 Tabletten, 100 Tabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

#### **Zulassungsinhaber und Hersteller:**

Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH

Schiffenberger Weg 55

35394 Giessen

Deutschland

Telefon +49-641-7960-0

Telefax +49-641-7960-109

E-Mail: info@pascoe.de

**Z.Nr.: 3-00349**

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2017



MIX  
Papier aus verantwor-  
tungsvollen Quellen

FSC® C113446

127790-AT-006