



**Lefax® intens Flüssigkapseln**

**250 mg Simeticon**

**Weichkapseln**

**Liebe Kundin, lieber Kunde!**

**Sie haben sich mit Lefax® intens Flüssigkapseln für ein Produkt entschieden, das Ihnen bei gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden schnell und zuverlässig hilft. Dabei ist es sehr gut verträglich.**

**Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Damit Sie einen bestmöglichen Behandlungserfolg erzielen, sollten Lefax® intens Flüssigkapseln vorschriftsmäßig wie unten beschrieben angewendet werden.**

**Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Darüber hinaus berät Sie Ihr Arzt oder Apotheker.**

**Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, sollten Sie zur Abklärung einen Arzt aufsuchen.**

**Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet:**

1. Was sind Lefax® intens Flüssigkapseln und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Lefax® intens Flüssigkapseln beachten?
3. Wie sind Lefax® intens Flüssigkapseln einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Lefax® intens Flüssigkapseln aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## **1. WAS SIND LEFAX® INTENS FLÜSSIGKAPSELN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?**

Dieses Medizinprodukt enthält Simeticon, eine Substanz mit entschäumender und schaumverhütender Wirkung.

Lefax® intens Flüssigkapseln werden angewendet

- zur Linderung und symptomatischen Behandlung gasbedingter Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen (Meteorismus), Völlegefühl, Aufstoßen, krampfartige Bauchschmerzen, postoperative gasbedingte Schmerzen und funktionelle Dyspepsie.
- zur Vorbereitung der Diagnostik im Bauchbereich, wie z.B. Endoskopie, Röntgen und Sonographie.

## **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON LEFAX® INTENS FLÜSSIGKAPSELN BEACHTEN?**

Lefax®-intens Flüssigkapseln dürfen nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Simeticon oder einen der sonstigen Bestandteile von Lefax®-intens Flüssigkapseln sind.

Die Behandlungsdauer richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden. Bei Bedarf können Lefax®-intens Flüssigkapseln über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. Bei anhaltenden Beschwerden sollte eine organische Ursache ausgeschlossen werden.

### **Während Schwangerschaft und Stillzeit**

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von Lefax®-intens Flüssigkapseln während der Schwangerschaft und Stillzeit, da Simeticon aus dem Darm unverändert wieder ausgeschieden und nicht vom Körper aufgenommen wird. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, zuvor den Arzt zu fragen.

### **Anwendung bei Kindern**

Für Kinder unter 14 Jahren werden andere Darreichungsformen empfohlen, z.B. Suspension zum Einnehmen oder Kautabletten.

### **Bei Einnahme von Lefax®-intens Flüssigkapseln mit anderen Präparaten**

Klinisch relevante Wechselwirkungen sind bisher nicht bekannt.

## **3. WIE SIND LEFAX®-INTENS FLÜSSIGKAPSELN EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Lefax®-intens Flüssigkapseln immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsanweisung ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

### **Dosierung und Dauer der Anwendung**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Lefax®-intens Flüssigkapseln nicht anders verordnet hat.

- **Bei gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden:**

<b>Alter</b>	<b>Einzeldosis</b>	<b>Tagesgesamtdosis</b>
Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren	1 Weichkapsel (entsprechend 250 mg Simeticon)	4 Weichkapseln (entsprechend 1000 mg Simeticon)

- **Zur Vorbereitung für bildgebende Untersuchungen:**

<b>Alter</b>	<b>am Tag vor der Untersuchung</b>	<b>am Morgen der Untersuchung</b>
Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren	1 – 2 Weichkapseln (entsprechend 250 mg bis 500 mg Simeticon)	1 Weichkapsel (entsprechend 250 mg Simeticon)

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden.

Lefax®-intens Flüssigkapseln können, falls erforderlich, auch über längere Zeit eingenommen werden. Bei anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, damit die Ursache untersucht werden kann.

### **Wie sind Lefax®-intens Flüssigkapseln einzunehmen?**

Lefax®-intens Flüssigkapseln sind zu oder nach den Mahlzeiten, bei Bedarf auch vor dem Schlafengehen einzunehmen. Die Weichkapseln werden unzerkaut mit genügend Flüssigkeit (z.B. 1 Glas Wasser) geschluckt.

**Was ist zu tun, wenn Sie eine größere Menge Lefax®-intens Flüssigkapseln eingenommen haben als Sie sollten?**

Auch große Mengen werden problemlos vertragen, da die Wirksubstanz der Weichkapseln ausschließlich physikalisch wirkt und biologisch und chemisch vollkommen inaktiv ist.

**Was ist zu tun, wenn Sie die Einnahme von Lefax®-intens Flüssigkapseln vergessen haben?**

Führen Sie die Behandlung ohne Änderung der Dosierung fort.

**Was passiert, wenn Sie die Einnahme von Lefax®-intens Flüssigkapseln vorzeitig beenden?**

In diesem Fall kann es zu einem Wiederauftreten der Beschwerden kommen.

#### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Lefax®-intens Flüssigkapseln wurden bisher nicht beobachtet.

Der Wirkstoff Simeticon löst den Schaum im Magen und Darm auf und wird vom Magen-Darm-Trakt nicht aufgenommen. Deshalb sind auch bei großen Mengen keine Nebenwirkungen durch Simeticon zu erwarten.

Falls Sie trotzdem Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte dem Arzt oder Apotheker mit.

#### **5. WIE SIND LEFAX®-INTENS FLÜSSIGKAPSELN AUFZUBEWAHREN?**

Dieses Produkt ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Es darf nach dem auf dem Umkarton und dem Blister aufgedruckten Verfalldatum nicht mehr verwendet werden.

**Aufbewahrungshinweis**

Lefax®-intens Flüssigkapseln nicht über 25°C lagern!

Vor Sonnenlicht schützen!

#### **6. WEITERE INFORMATIONEN**

1 Weichkapsel enthält 250 mg Simeticon.

Die sonstigen Bestandteile sind: Gelatine, Glycerol, gereinigtes Wasser.

Lefax®-intens Flüssigkapseln sind in Packungen mit 20 und 50 Weichkapseln erhältlich.

**Medizinprodukt**

CE 0482

**Hersteller:**

Hälsa Pharma GmbH  
Maria-Goeppert-Straße 5  
23562 Lübeck, Deutschland  
Info@haelsa.de

**Vertrieb in Deutschland:**

Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen

**Vertrieb in Österreich:**

Bayer Austria GesmbH, 1160 Wien

**Stand der Information: Januar 2019**

Bedeutung der Symbole:



< Bitte Gebrauchsinformation beachten!>



<Höchsttemperatur>



<Lichtschutz>



<Verwendbar bis>



<Chargenbezeichnung>



<Hersteller>