

## **Nociceptol® schmerzlinderndes Gel mit ätherischen Ölen 40ml und 120ml**

lindert

- Muskelschmerzen
- Gelenksschmerzen
- Posttraumatische Schmerzen

ohne Zusatz von Konservierungsmitteln

Thermischer Effekt

**Nociceptol® schmerzlinderndes Gel** ist ein Gel, das Muskel-, Gelenk- und posttraumatische Schmerzen insbesondere dank des kombinierten Wärme- und Kälteeffektes schnell lindert. Die thermischen Empfindungen variieren je nach Anwender. Ätherischen Öle unterstützen den Effekt mit ihren natürlichen Eigenschaften.

**Nociceptol® schmerzlinderndes Gel** verringert Schwellungen. Daher kann es bei Kontrakturen, Verstauchungen, Prellungen, Überdehnungen, Zerrungen und verschiedenen anderen Traumata angewendet werden.

**Anwendung:** Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren. 3- bis 4-mal täglich auf die schmerzenden Stellen auftragen und leicht einmassieren (nicht reiben). Hände nach Anwendung waschen.

**Zusammensetzung:** Wasser, Alkohol, PPG-1PEG-9 Lauryl, Glycol Ether, Menthol; ätherisches Pfefferminzöl (Mentha piperita), Wasser, Propylenglycol, Ackerschachtelhalmextrakt (Equisetum arvense), Wasser, Propylenglykol, Extrakt der afrikanischen Teufelskrallenwurzel (Harpagophytum procumbens), Campher, Illit, Carbomer, Extrakt aus Rosmarinblättern (Rosmarinus officinalis), ätherisches Cajeputöl (Melaleuca leucadendron), ätherisches Thymianöl aus Blüten und Blättern (Thymus vulgaris), Natriumhydroxid, CL 42090.

Jeder schwerwiegende Vorfall (der zum Tod oder zu einer ernsthaften Verschlechterung des Gesundheitszustands einer Patientin/eines Patienten geführt hat oder führen könnte), in Verbindung mit dem Produkt, muss unter [vigilance@polidis.fr](mailto:vigilance@polidis.fr) sowie der zuständigen Behörde des Landes gemeldet werden.

### **NICHT FETTEND – NICHT ABFÄRBEND – NICHT KLEBRIG**

**Warnhinweise:** Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht schlucken. Nicht anwenden bei Kindern unter 7 Jahren. Nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen. Wenn Sie an Krampfanfällen oder epileptischen Anfällen leiden bzw. in der Vergangenheit betroffen waren, fragen Sie Ihre Hausärztin/Ihren Hausarzt um Rat. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Nicht auf offene Wunden oder auf geschädigte oder gereizte Haut auftragen. Nicht unter einem Okklusivverband verwenden. Nicht in Kombination mit anderen Cremes, Balsamen, Salben, Sprays oder Massageölen verwenden. Nicht mit anderen Wärmequellen verwenden. Bei Verschlucken sofort eine Ärztin/einen Arzt, eine Apothekerin/einen Apotheker oder eine Giftnotrufzentrale kontaktieren. Wenn die Schmerzen länger als 5 Tage anhalten oder wenn sich nach der Anwendung eine Reizung entwickelt, beenden Sie die Anwendung des Gels und konsultieren Sie eine Ärztin/einen Arzt. Einige Inhaltsstoffe können allergische Reaktionen hervorrufen. Wenn Reizungen oder andere Anzeichen einer Überempfindlichkeit auftreten, brechen Sie die Behandlung sofort ab. Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem Ablaufdatum.

Vertrieb:

+WPharma GmbH

Anton Anderer-Platz 6/Top 1

1210 Wien, Austria

[info@pluswpharma.com](mailto:info@pluswpharma.com)

Hersteller:

laboratoire POLIDIS

19, rue Edmond Blanc

92500 Ruweil-Malmaison

France

[www.polidis.fr](http://www.polidis.fr)

Medizinprodukt



Rev: 2023/05/A

ADGLLANI23